Карпенко Николай Иванович (Москва). Доктор технических наук, профессор, академик РААСН. Руководитель лаборатории НИИСФ РААСН (Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук). Эл. почта: niisf_lab9@mail.ru.

Карпенко Сергей Николаевич (Москва). Доктор технических наук. Главный научный сотрудник НИИСФ РААСН (Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук). Эл. почта: niisf_lab9@mail.ru.

Karpenko Nikolai I. (Moscow). Doctor of Technical Sciences, Professor. Chief Research Officer of the laboratory at the Research Institute of Building Physics of RAACS (21 Lokomotivny proezd, Moscow, 127238. NIISF RAACS). E-mail: niisf_lab9@mail.ru.

Karpenko Sergey N. (Moscow). Doctor of Technical Sciences. Chief Researcher at the Research Institute of Building Physics of RAACS (21 Lokomotivny proezd, Moscow, 127238. NIISF RAACS). E-mail: niisf_lab9@mail.ru.

© Карпенко Н.И., Карпенко С.Н., 2021.
Academia. Архитектура и строительство, № 4, стр. 94–98.

О двухфакторной гравитонной модели сил тяжести при малых и больших скоростях движения тел

Н.И.Карпенко, НИИСФ РААСН, РААСН, Москва

С.Н.Карпенко, НИИСФ РААСН, Москва

Силы тяжести (силы гравитационного, гравитонного притяжения) тел играют важную роль в различных областях науки и техники, в том числе и в строительной отрасли. Эти силы определяются на основании закона притяжения И. Ньютона. Однако физическая природа переносчика сил притяжения в этом законе остается открытой.

В работах авторов физическая природа формирования и передачи сил тяжести раскрывается на основании установленных закономерностей вхождения в массу и реактивного выброса из неё с большой скоростью потоков гравитонов (условно – за счёт гравитонного дыхания масс) с последующим рассеиванием и действием рассеянных потоков на встречные массы тел (условно на встречные тела). Показано, что взаимное действие потоков гравитонов двух тел сводится к закону тяготения И. Ньютона.

В данной статье показано развитие гравитонной модели с учётом влияния на массу двух факторов, связанных с выбрасываемыми из неё гравитонами. С одной стороны, они разуплотняют массу при движении внутри неё, а с другой – уплотняют её всесторонним сжатием при выбросах.

Указанный двойственный характер меняет представление о гравитационном ускорении.

Рассмотрено развитие гравитонной модели притяжения тел на тела, движущиеся с большими скоростями. При этом закон И. Ньютона выполняется только в случае, когда скорости движения тел являются одинаковыми. Притяжение тел, движущихся с большой скоростью, другим телом равносильно увеличению массы движущихся тел по формуле Лоренца. С другой стороны, сила притяжения

движущихся тел, наоборот, снижается обратно пропорционально формуле Лоренца.

При этом, согласно гравитонной модели, массы тел не изменяются, а указанное их увеличение и уменьшение связано с особенностями действия гравитонов.

Ключевые слова: силы тяжести, масса тела, потоки гравитонов, скорость потоков, реактивный выброс, силы сжатия, разуплотнение и уплотнение массы, двойственный характер сил тяжести, скорость движения тел, усиление выброса гравитонов, усиление и ослабление сил притяжения.

On the Two-Factor Graviton Model of Gravity Forces at Low and High Velocities of Motion of Bodies

N.I.Karpenko, NIISF RAACS, RAACS, Moscow

S.N.Karpenko, NIISF RAACS, Moscow

The gravity forces (the forces of gravitational attraction, gravitonic attraction) of bodies play an important role in various fields of science and technology, including the construction industry. These forces are determined on the basis of Newton's law of gravity. However, the physical nature of the carrier of the forces of attraction in this law remains open.

In the works of the authors, the physical nature of the formation and transmission of gravity forces is revealed based on the established regularities of entry into the mass and reactive ejection from it at a high speed of gravitonic flows (conditionally due to gravitonic respiration of masses), followed by scattering and the action of scattered flows on oncoming masses of bodies (conditionally on oncoming

bodies). It is shown that the mutual action of gravitonic flows of two bodies is reduced to the law of gravity of I. Newton.

In this article, the development of the graviton model is given, taking into account the influence of two factors on the mass associated with the gravitons ejected from it. On the one hand, they decompress the mass when moving inside it, and on the other, they compact it with a comprehensive compression during ejections.

This dual character changes the idea of gravitational acceleration.

The development of the graviton model of attraction of bodies to bodies moving at high speeds is considered. At the same time, Newton's law is fulfilled only in the case when the speeds of the bodies are the same. The attraction of bodies moving at high speed by another body is equivalent to an increase in the mass of moving bodies according to the Lorentz formula. On the other hand, the force of attraction of moving bodies, on the contrary, decreases inversely proportional to the Lorentz formula.

At the same time, according to the graviton model, body masses do not change, and their increase and decrease are associated with the peculiarities of the action of gravitons.

Keywords: gravity, body mass, flows of gravitons, speed of flows, jet ejection, compressive forces, decompression and compaction of mass, the dual nature of gravity, speed of movement of bodies, increase in the release of gravitons, strengthening and weakening of the forces of attraction.

Силы гравитационного притяжения тел играют важную роль как в современной механике и физике, так и в различных областях науки и техники. Эти силы определяются на основе закона притяжения И. Ньютона [1] и развития его представлений в массе тел [2; 3]. Наименее выясненным в законе И. Ньютона остаётся представление о формировании и дальнодействии гравитационного притяжения. Для обхода этих трудностей А. Эйнштейн предложил рассматривать гравитационные эффекты, создаваемые массой, как изменение (искривление) пространства, окружающего массу [4].

Отдельные объяснения связаны с возможным влиянием гравитонов. Как указано в [5], мнение о том, что гравитоны могут передавать гравитационную силу, поддерживается многими физиками, хотя имеются и критические замечания [6]. Они связаны с тем, что оставался не ясным механизм действия гравитонов. В работах [7–9] предложено решение этого вопроса на основании концепции вхождения в массу и последующего реактивного выброса из неё потоков гравитонов и их действия на встречные тела. Рассматриваются тела шаровидной формы. В данной статье представлено развитие этого направления. Учитывается двойственный характер влияния на массу выбросов гравитонов и возможное изменение скорости выброса гравитонов.

Исходные зависимости гравитонной модели и её особое физическое условие (без учёта влияния скорости движения тел, условно в стационарных условиях).

Следуя [7; 8], рассмотрим тело шаровидной формы с центром тяжести в центре шара, обозначим: r_1 – радиус шара, m_1 – масса шара, Δm_1 – единичная масса (доля массы шара, отнесенная к единице её поверхности),

$$\Delta m_1 = \frac{m_1}{4\pi r_1^2}. \quad (1)$$

Массу окружают гравитоны, которые входят в неё со скоростью v_1 и выбрасываются из неё чередующимися всесторонними реактивными потоками со скоростью V_1 , вызывая гравитонное притяжение к ней других масс. В работе [7] рассмотрены иные формирования потоков гравитонов, но все они приводят к одинаковым результатам. Гравитонные потоки оказывают на массу двойное действие. С одной стороны, входя в массу со скоростью v_1 , они её разуплотняют, а с другой стороны, выброс гравитонов из массы приводит к её всестороннему сжатию. Снижение сжатия массы m_1 вследствие эффекта разуплотнения будем учитывать коэффициентом снижения гравитонного сжатия Q_1 . Силу сжатия f_1 поверхности единичной массы от выброса гравитонов можно с учётом указанного коэффициента Q_1 определить из известного из теории реактивных двигателей уравнения, представив его в виде:

$$f_1 = \frac{\Delta m_1}{\Delta t_1} Q_1 V_1 = \frac{m_1 Q_1 V_1}{4\pi r_1^2 \Delta t_1} = \frac{\Delta \eta_1 m_{01} Q_1 V_1}{\Delta t_1} = \bar{\eta}_1 m_{01} Q_1 V_1, \quad (2)$$

где

$$m_1 = \Delta \eta_1 m_{01} 4\pi r_1^2, \quad (3)$$

$\Delta \eta_1$ – количество гравитонов, выбрасываемых за время Δt_1 с единицы поверхности шара (общий поток),

m_{01} – включение массы на выброс одного гравитона,

$\bar{\eta}_1$ – количество гравитонов, выбрасываемых с поверхности шара за единицу времени (условно единичный поток гравитонов):

$$\bar{\eta}_1 = \frac{\Delta \eta_1}{\Delta t_1}. \quad (4)$$

Используется связь выражения (2) с традиционным проявлением гравитации в виде ускорения α , с которым притягиваются тела к центру рассматриваемого шара. Согласно, например, [5], гравитационное ускорение на поверхности шара составляет:

$$\alpha = \frac{\gamma m_1}{r_1^2}, \quad (5)$$

где γ – гравитационная постоянная.

Ускорение (5) вызывает гравитационное сжатие единичной массы силой f_1 , которая, учитывая (1), (5), будет равна:

$$f_1 = \Delta m_1 \cdot \alpha = \frac{\gamma m_1^2}{4\pi r_1^4}. \quad (6)$$

Приравнявая (2) и (6), находим:

$$f_1 = \frac{\gamma m_1^2}{4\pi r_1^4} = \frac{\Delta\eta_1 m_{01} Q_1 V_1}{\Delta t_1} = \bar{\eta}_1 m_{01} Q_1 V_1. \quad (7)$$

Единичный поток гравитонов будет равен:

$$\bar{\eta}_1 = \frac{\gamma m_1^2}{4\pi r_1^4 m_{01} Q_1 V_1}. \quad (8)$$

Сопоставляя (2) и (6) можно заметить, что:

$$\alpha = \frac{Q_1 V_1}{\Delta t_1} = \frac{\gamma m_1}{r_1^2} = \gamma^* \Delta m_1, \quad (9)$$

где

$$\gamma^* = 4\pi\gamma. \quad (10)$$

Пусть на расстоянии R от тела m_1 находится тело m_2 с радиусом r_2 (R – расстояние между центрами тяжести m_1 и m_2). При этом в зависимостях (1) – (8) формально индекс «1» заменяется на индекс «2». В результате условие (7) и поток гравитонов $\bar{\eta}_2$ в виде (8) для тела m_2 представляются в виде

$$f_2 = \frac{\gamma m_2^2}{4\pi r_2^4} = \frac{\Delta\eta_2 m_{02} Q_2 V_2}{\Delta t_2} = \bar{\eta}_2 m_{02} Q_2 V_2, \quad (11)$$

$$\bar{\eta}_2 = \frac{\Delta\eta_2}{\Delta t_2} = \frac{\gamma m_2^2}{4\pi r_2^4 m_{02} Q_2 V_2}, \quad (12)$$

где также

$$m_2 = \Delta\eta_2 m_{02} 4\pi r_2^2. \quad (13)$$

Рассмотрим определение сил действия потоков гравитонов тела m_1 на тело m_2 и наоборот (сил взаимодействия).

При рассмотрении действия потоков гравитонов $\bar{\eta}_1$ на тело m_2 и $\bar{\eta}_2$ на тело m_1 необходимо учитывать три фактора, в первую очередь – фактор их рассеивания. Применительно к рассматриваемой модели на расстоянии R условие рассеивания потоков гравитонов $\bar{\eta}_1$ и $\bar{\eta}_2$ будет согласно [7] представляться в виде:

$$\bar{\eta}_{12} = \bar{\eta}_1 \frac{4\pi r_1^2}{4\pi R^2} = \bar{\eta}_1 \frac{r_1^2}{R^2}; \quad \bar{\eta}_{21} = \bar{\eta}_2 \frac{r_2^2}{R^2}. \quad (14)$$

Второй фактор: если потоки тела m_1 пересекают тело m_2 и наоборот, то для их полного выброса из масс необходимо, чтобы в зависимостях (3), (13) величины m_{01} , m_{02} изменялись так, что:

$$m_1 = \Delta\eta_2 m'_{01} 4\pi r_1^2, \quad m_2 = \Delta\eta_1 m'_{02} 4\pi r_2^2, \quad (15)$$

где m'_{01} – часть массы m_1 , которая включается на выброс одного гравитона из потока $\Delta\eta_2$ тела m_2 , m'_{02} – аналогично, часть массы тела m_2 , которая включается на выброс одного гравитона $\Delta\eta_1$ из потока тела m_1 .

К третьему фактору относятся определение общих потоков гравитонов $\bar{\eta}_{s12}$ тела m_1 и $\bar{\eta}_{s21}$ тела m_2 , пересекающих соответственно сферические тела m_2 и m_1 . Согласно [8]

$$\bar{\eta}_{s12} = 4\pi r_2^2 \bar{\eta}_{12} = \bar{\eta}_1 \frac{r_1^2}{R^2} 4\pi r_2^2, \quad \bar{\eta}_{s21} = 4\pi r_1^2 \bar{\eta}_{21} = \bar{\eta}_2 \frac{r_2^2}{R^2} 4\pi r_1^2. \quad (16)$$

Соответственно общие силы выброса F_{s12} и F_{s21} гравитонов масс m_1 , m_2 из масс m_1 , m_2 по аналогии с (7), (11) представляется в виде:

$$\left. \begin{aligned} F_{12} &= \bar{\eta}_{s12} m'_{02} Q_2 V_2 = \bar{\eta}_1 \frac{r_1^2}{R^2} 4\pi r_2^2 m'_{02} Q_2 V_2, \\ -F_{21} &= \bar{\eta}_{s21} m'_{01} Q_1 V_1 = \bar{\eta}_2 \frac{r_2^2}{R^2} 4\pi r_1^2 m'_{01} Q_1 V_1, \end{aligned} \right\} \quad (17)$$

или учитывая (8), (12)

$$\left. \begin{aligned} F_{12} &= \frac{\gamma m_1^2 r_1^2 4\pi r_2^2 m'_{02} Q_2 V_2}{4\pi r_1^4 m_{01} Q_1 V_1 R^2} = \frac{\gamma m_1^2 r_2^2 m'_{02} Q_2 V_2}{r_1^2 m_{01} R^2 Q_1 V_1}, \\ -F_{21} &= \frac{\gamma m_2^2 r_2^2 4\pi r_1^2 m'_{01} Q_1 V_1}{4\pi r_2^4 m_{02} Q_2 V_2 R^2} = \frac{\gamma m_2^2 r_1^2 m'_{01} Q_1 V_1}{r_2^2 m_{02} R^2 Q_2 V_2}. \end{aligned} \right\} \quad (18)$$

Из зависимостей (3), (13) и (15) следует

$$\left. \begin{aligned} \frac{m_2}{m_1} &= \frac{\Delta\eta_1 m'_{02} 4\pi r_2^2}{\Delta\eta_1 m_{01} 4\pi r_1^2} = \frac{m'_{02} r_2^2}{m_{01} r_1^2}, \\ \frac{m_1}{m_2} &= \frac{\Delta\eta_2 m'_{01} 4\pi r_1^2}{\Delta\eta_2 m_{02} 4\pi r_2^2} = \frac{m'_{01} r_1^2}{m_{02} r_2^2}. \end{aligned} \right\} \quad (19)$$

С учетом (19) зависимости (18) преобразовываются к виду

$$F_{12} = \frac{\gamma m_1 m_2 Q_2 V_2}{R^2 Q_1 V_1}, \quad -F_{12} = \frac{\gamma m_1 m_2 Q_1 V_1}{R^2 Q_2 V_2}. \quad (20)$$

При

$$Q_1 V_1 = Q_2 V_2, \quad (21)$$

приходим к закону тяготения И. Ньютона

$$F_{12} = -F_{12} = \frac{\gamma m_1 m_2}{R^2} \quad (22)$$

Таким образом, при условиях (21), (22) закон «действие равно противодействию» и закон притяжения И. Ньютона выполняются автоматически при несколько иной, согласно (9), трактовке гравитационного ускорения.

Уравнение гравитонной модели с учетом влияния скорости движения тел

Следуя [9] рассматриваются тела (массы) m_1 и m_2 (сокращенно m_i), которые переходят к движению соответственно со скоростями v_i относительно своего начального состояния, соответствующего $v_i = 0$ (здесь и ниже $i = 1, 2$). Увеличение скорости движения тел приводит к увеличению выбрасываемых из них потоков гравитонов. При этом силы сжатия f_i тел увеличиваются до некоторых значений $\tilde{f}_i$, приводя к увеличению деформаций тел. В результате радиус тел уменьшается до значений $\tilde{r}_i$, приводя к изменению единичных масс Δm_i до значений

$$\Delta \tilde{m}_i = \frac{m_i}{4\pi \tilde{r}_i^2} = \Delta m_i \frac{r_i^2}{\tilde{r}_i^2}. \quad (23)$$

При этом массы m_i не изменяются, происходит только их уплотнение. Примем закономерность изменения радиуса в виде

$$\tilde{r}_i^2 = r_i^2 \gamma_{it} \sqrt{1 - \frac{v_i^2}{n_i^2 \tilde{v}^2}} = r_i^2 \beta_i, \quad \beta_i = \frac{\tilde{r}_i^2}{r_i^2} = \gamma_{it} \sqrt{1 - \frac{v_i^2}{\tilde{v}^2 \eta_i}} = \gamma_{it} \tilde{\beta}_i, \quad (24)$$

$i = 1, 2,$

где β_i , $\tilde{\beta}_i$, n_i – обобщенные параметры податливости тел сжатию, на микроуровне $n_i = 1$, на макроуровне n_i изменяется, $\tilde{v}$ – максимальная скорость выброса гравитонов, параметр γ_{it} указан в (26).

С учетом (24)

$$\Delta \tilde{m}_i = \frac{\Delta m_i}{\beta_i}. \quad (25)$$

Полагаем, что при этом могут изменяться единичные доли масс m_{oi} и время выброса гравитонов Δt_i до значений

$$\tilde{m}_{oi} = m_{oi} \gamma_{oi}, \quad \Delta \tilde{t}_i = \Delta t_i \gamma_{it}, \quad (26)$$

где γ_{oi} и γ_{it} , ($i = 1, 2$), – коэффициенты изменения.

Гравитонное уравнение (2), (4) для движущихся тел представляется в виде

$$\tilde{f}_i = \frac{\Delta \tilde{m}_i}{\Delta \tilde{t}_i} \tilde{Q}_i \tilde{V}_i = \frac{\Delta \tilde{m}_i \tilde{m}_{oi} \tilde{Q}_i \tilde{V}_i}{\Delta \tilde{t}_i} = \tilde{\eta}_i \tilde{m}_{oi} \tilde{V}_i \tilde{Q}_i, \quad (27)$$

где по аналогии с (4) единичный поток гравитонов

$$\tilde{\eta}_i = \frac{\Delta \tilde{m}_i}{\Delta \tilde{t}_i}. \quad (28)$$

$\tilde{V}_i$ – изменяемая скорость выброса гравитонов из движущихся тел, $\tilde{Q}_i$ – соответственно изменяемый коэффициент гравитационного сжатия.

По аналогии с (6), (8) определяется сила $\tilde{f}_i$ через гравитационное ускорение движущихся тел

$$a = \frac{\gamma m_i}{\tilde{r}_i^2} = \frac{\gamma m_i}{r_i^2 \beta_i}, \quad (29)$$

$$\tilde{f}_i = \frac{\gamma m_i}{\tilde{r}_i^2} \cdot \frac{\gamma m_i}{4\pi \tilde{r}_i^2} = \frac{\gamma m_i^2}{4\pi \tilde{r}_i^4} = \frac{\gamma m_i^2}{4\pi r_i^4 \beta_i^2}. \quad (30)$$

Приравнявая (27) и (30), находим

$$\tilde{\eta}_i = \frac{\gamma m_i^2}{4\pi \tilde{r}_i^4 \tilde{m}_{oi} \tilde{V}_i \tilde{Q}_i}. \quad (31)$$

В данном случае по аналогии с (9)

$$\frac{\tilde{Q}_i \tilde{V}_i}{\Delta \tilde{t}_i} = \frac{\gamma m_i}{\tilde{r}_i^2} = \frac{\gamma m_i}{r_i^2 \beta_i} \quad (32)$$

или, дополнительно учитывая (26),

$$\frac{\tilde{Q}_i \tilde{V}_i}{\Delta \tilde{t}_i \gamma_{it}} \beta_i = \frac{\gamma m_i}{r_i^2}. \quad (33)$$

Сопоставляя (33) с (10) можно выразить $\tilde{Q}_i$, $\tilde{V}_i$ через Q_i , V_i :

$$\frac{\tilde{Q}_i \tilde{V}_i \beta_i}{\gamma_{it}} = Q_i V_i \text{ или } \tilde{Q}_i \tilde{V}_i = \frac{Q_i V_i}{\tilde{\beta}_i} \quad (34)$$

Определим силы взаимного притяжения тел при больших скоростях их движения.

Для первого тела m_1 ($i = 1$) и второго тела m_0 ($i = 2$) потоки $\tilde{\eta}_1, \tilde{\eta}_2$ согласно (31) будут равны

$$\tilde{\eta}_1 = \frac{\gamma m_1^2}{4\pi \tilde{r}_1^4 \tilde{m}_{o1} \tilde{V}_1 \tilde{Q}_1}, \quad \tilde{\eta}_2 = \frac{\gamma m_2^2}{4\pi \tilde{r}_2^4 \tilde{m}_{o2} \tilde{V}_2 \tilde{Q}_2}. \quad (35)$$

При достижении потоками $\tilde{\eta}_1$ тела m_2 и потоками $\tilde{\eta}_2$ тела m_1 они будут изменяться.

$$\tilde{\eta}_{12} = \tilde{\eta}_1 \frac{\tilde{r}_1^2}{R^2}, \quad \tilde{\eta}_{21} = \tilde{\eta}_2 \frac{\tilde{r}_2^2}{R^2}. \quad (36)$$

Общие потоки, которые обозначим $\tilde{\eta}_{s12}$, $\tilde{\eta}_{s21}$, пересекающие полностью поверхности m_2 и m_1 , по аналогии с (16), будут равны:

$$\tilde{\eta}_{s12} = \tilde{\eta}_{12} \cdot 4\pi \tilde{r}_2^2, \quad \tilde{\eta}_{s21} = \tilde{\eta}_{21} \cdot 4\pi \tilde{r}_1^2. \quad (37)$$

Сила $\tilde{F}_{12}$, с которой m_1 действует на тело m_2 , и сила $\tilde{F}_{21}$, с которой, наоборот, m_2 действует на m_1 , будут равны

$$\tilde{F}_{12} = \tilde{\eta}_{s12} \tilde{m}'_{o2} \tilde{V}_2 \tilde{Q}_2, \quad -\tilde{F}_{21} = \tilde{\eta}_{s21} \tilde{m}'_{o1} \tilde{V}_1 \tilde{Q}_1, \quad (38)$$

Учитывая (35) – (38), силы притяжения $\tilde{F}_{12}$ и $\tilde{F}_{21}$, можно представить в виде:

$$\begin{aligned} \tilde{F}_{12} &= \frac{\gamma m_1^2 \tilde{r}_1^2 4\pi \tilde{r}_2^2 \tilde{m}'_{o2} \tilde{V}_2 \tilde{Q}_2}{4\pi \tilde{r}_1^4 \tilde{m}_{o1} \tilde{V}_1 \tilde{Q}_1 R^2} = \frac{\gamma m_1^2 \tilde{r}_1^2 \tilde{m}'_{o2} \tilde{Q}_2 \tilde{V}_2}{\tilde{r}_1^2 \tilde{m}_{o1} \tilde{V}_1 \tilde{Q}_1 R^2}, \\ -\tilde{F}_{21} &= \frac{\gamma m_2^2 \tilde{r}_2^2 4\pi \tilde{r}_1^2 \tilde{m}'_{o1} \tilde{V}_1 \tilde{Q}_1}{4\pi \tilde{r}_2^4 \tilde{m}_{o2} \tilde{V}_2 \tilde{Q}_2 R^2} = \frac{\gamma m_2^2 \tilde{r}_2^2 \tilde{m}'_{o1} \tilde{V}_1 \tilde{Q}_1}{\tilde{r}_2^2 \tilde{m}_{o2} \tilde{Q}_2 \tilde{V}_2 R^2}. \end{aligned} \quad (39)$$

Здесь также по аналогии с (3), (13), (15), чтобы потоки тела m_1 полностью выбрасывались из тела m_2 и, наоборот, необходимо эти зависимости с учётом (27), (38) представлять в виде

$$\left. \begin{aligned} \Delta \tilde{m}_1 &= \frac{m_1}{4\pi \tilde{r}_1^2} = \Delta \tilde{\eta}_1 \tilde{m}_{o1} = \Delta \tilde{\eta}_2 \tilde{m}'_{o1}, \\ \Delta \tilde{m}_2 &= \frac{m_2}{4\pi \tilde{r}_2^2} = \Delta \tilde{\eta}_2 \tilde{m}_{o2} = \Delta \tilde{\eta}_1 \tilde{m}'_{o2}. \end{aligned} \right\} \quad (40)$$

Из зависимостей (40) следует

$$\left. \begin{aligned} \frac{m_2}{m_1} &= \frac{\Delta \tilde{\eta}_1 \tilde{m}'_{o2} 4\pi \tilde{r}_2^2}{\Delta \tilde{\eta}_1 \tilde{m}_{o1} 4\pi \tilde{r}_1^2} = \frac{\tilde{m}'_{o2} \tilde{r}_2^2}{\tilde{m}_{o1} \tilde{r}_1^2}, \\ \frac{m_1}{m_2} &= \frac{\Delta \tilde{\eta}_2 \tilde{m}'_{o1} 4\pi \tilde{r}_1^2}{\Delta \tilde{\eta}_2 \tilde{m}_{o2} 4\pi \tilde{r}_2^2} = \frac{\tilde{m}'_{o1} \tilde{r}_1^2}{\tilde{m}_{o2} \tilde{r}_2^2}. \end{aligned} \right\} \quad (41)$$

С учётом (41) зависимости (39) преобразовываются к виду

$$\tilde{F}_{12} = \frac{\gamma m_1 m_2 \tilde{Q}_2 \tilde{V}_2}{R^2 \tilde{Q}_1 \tilde{V}_1}, \quad -\tilde{F}_{21} = \frac{\gamma m_1 m_2 \tilde{Q}_1 \tilde{V}_1}{R^2 \tilde{Q}_2 \tilde{V}_2}. \quad (42)$$

Выражая в (42) значения $\tilde{Q}_i$, $\tilde{V}_i$ через Q_i , V_i по зависимостям (34) и полагая согласно (21) $V_1 Q_1 = V_2 Q_2$, зависимости (42) преобразовываются к виду

$$\begin{aligned} F_{12} &= \frac{\gamma m_1 m_2 Q_2 V_2 \tilde{\beta}_1}{R^2 \tilde{\beta}_2 Q_1 V_1} = \frac{\gamma m_1 m_2 \tilde{\beta}_1}{R^2 \tilde{\beta}_2}, \\ -F_{21} &= \frac{\gamma m_1 m_2 Q_1 V_1 \tilde{\beta}_2}{R^2 \tilde{\beta}_1 Q_2 V_2} = \frac{\gamma m_1 m_2 \tilde{\beta}_2}{R^2 \tilde{\beta}_1}. \end{aligned} \quad (43)$$

Зависимости (43) приводят к интересным условиям.

Пусть, например, тело m_1 находится в стационарных условиях, когда $\beta_1 = 1$, а тело m_2 движется с большой скоростью v_2 , тогда сила притяжения F_{12} возрастает до величины $1/\tilde{\beta}_2$, что равносильно увеличению массы тела m_2 до величины $m_2/\tilde{\beta}_2$. При $\tilde{V} = c$, где c – скорость света, это увеличение массы тела совпадает с полученным увеличением массы тела в опытах Лоренца. Формул Лоренца также используется в специальной теории относительности А. Эйнштейна. В представленной гравитонной модели такой эффект достигается без изменения масс тела. Имеются и другие различия. Так, притяжения телом m_2 тела m_1 при увеличении скорости v_2 равносильно согласно (43), наоборот уменьшению массы тела m_2 до значений $m_2 \tilde{\beta}_2$. Если тела m_1 и m_2 движутся в пространстве с одинаковой большой скоростью ($v_1 = v_2$), тогда $\tilde{\beta}_1/\tilde{\beta}_2 = 1$ и закон притяжения И. Ньютона начинает соблюдаться в традиционном виде

$$F_{12} = -F_{21} = \frac{\gamma m_1 m_2}{R^2},$$

то есть также, как если бы оба тела находились в стационарных условиях.

Литература

1. Ньютон, И. Математические начала натуральной философии / И. Ньютон. – М. : Наука, 1989. – С. 690.
2. Джемер, М. Понятие массы в классической и современной физике / М. Джемер. – М. : Прогресс, 1967. – С. 256.
3. Забельский, Ф.С. Масса и её измерение / Ф.С. Забельский. – М. : Атомиздат, 1974.
4. Эйнштейн, А. Сущность теории относительности / А. Эйнштейн. – М. : Иностранная литература, 1959. – С. 160.
5. Грин, Б. Ткань космоса: Пространство, время и текстура реальности / Б. Грин. – М. : ЛИБРОКОМ, 2009.
6. Кемпфер, Ф.А. Путь в современную физику / Ф.А. Кемпфер. – М. : Мир, 1972.
7. Карпенко, Н.И. О реактивной природе сил тяжести / Н.И. Карпенко, С.Н. Карпенко // Academia. Архитектура и строительство. – 2014. – № 1. – С. 87–88.

8. Карпенко, Н.И. О физической природе формирования и передачи сил тяжести / Н.И. Карпенко, С.Н. Карпенко // Естественные и технические науки. – 2015. – № 4. – С. 26–31.

9. Карпенко, Н.И. О двух подходах к определению сил притяжения гравитонной модели и их изменений при больших скоростях движения тел / Н.И. Карпенко, С.Н. Карпенко. // Academia. Архитектура и строительство. – 2020. – № 4. – С. 70–75.

References

1. Nyuton Isaak. Matematicheskie nachala natural'noi filosofii [Philosophia Naturalis Principia Mathematica]. Moscow, Nauka Publ., 1989, 690 p. (In Russ.)
2. DzheMER Maks. Ponyatie massy v klassicheskoi i sovremennoi fizike [Concept of mass in classical and modern physics]. Moscow, Progress Publ., 1967, 256 p. (In Russ.)
3. F.S. Zabel'skii. Massa i ee izmerenie [Mass and its Measurement]. Moscow, Atomizdat Publ., 1974. (In Russ.)
4. A. Einshtein. Sushchnost' teorii otnositel'nosti [The meaning of relativity]. Moscow, Foreghn Literature Publ., 1959, 160 p. (In Russ.)
5. Brain Grin. Tkan' kosmosa: Prostranstvo, vremya i tekstura real'nosti [The Fabric of The Cosmos: Space, Time, and the Texture of Reality]. Moscow, LIBROKOM Publ., 2009. (In Russ.)
6. F. A. Kempfer. Put' v sovremennuyu fiziku [The Fabric of The Cosmos: Space, Time, and the Texture of Reality]. Moscow, Mir Publ., 1972. (In Russ.)
7. Karpenko N.I., Karpenko S.N. N.I. Karpenko, S.N. Karpenko. O reaktivnoi prirode sil tyazhesti [On the Reactive Nature of Gravity]. In: Academia. Arkhitektura i stroitel'stvo [Academia. Architecture and Construction], 2014, no. 1, pp. 87–88. (In Russ., abstr.in Engl.)
8. Karpenko N.I., Karpenko S.N. O fizicheskoi prirode formirovaniya i peredachi sil tyazhesti [On physical Nature of Generating and Transmitting Gravity Forces]. In: Estestvennye i tekhnicheskie nauki [Natural and technical sciences], 2015, no. 4, pp. 26–31. (In Russ.)
9. Karpenko N.I., Karpenko S.N. O dvukh podkhodakh k opredeleniyu sil prityazheniya gravitonnoi modeli i ikh izmenenii pri bol'shikh skorostyakh dvizheniya tel [On Two Approached to Determining the Gravitational Forces of the Graviton Model and Its Changeset at High Speeds of Motion of Bodies]. In: Academia. Arkhitektura i stroitel'stvo [Academia. Architecture and Construction], 2020, no. 4, pp. 70–75. (In Russ., abstr. in Engl.)